

USO DA CHUPETA E DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

da Paz SMRS, Bueno MB, de Souza JMP¹, de Souza SB¹

Universidade de São Paulo
- Faculdade de Saúde Pública- Av. Dr. Arnaldo, 715 São Paulo-SP

¹ Projeto financiado pela FAPESP

email:
susanaandrade1@clix.pt

A chupeta é muito utilizada tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, onde o desmame precoce é uma causa estabelecida de morbimortalidade infantil por doenças infecciosas. Embora seu uso não seja recomendado para crianças em aleitamento materno, há poucos estudos sobre a associação entre a utilização da chupeta e a duração da prática do aleitamento materno. Realizou-se este estudo com o objetivo de verificar a relação entre o uso da chupeta introduzida com até 30 dias de vida e a duração do aleitamento materno aos 12 meses de vida. Estudou-se uma coorte de 450 crianças nascidas sem intercorrências no Hospital Universitário da USP e seguidas até os 12 meses de vida. Para descrever a duração do aleitamento materno, segundo o uso da chupeta, utilizou-se a técnica de análise de sobrevivência de Kaplan-Meier. A mediana de duração do aleitamento materno das crianças que tiveram a introdução de chupeta com até 30 dias de vida (176 dias) foi menor do que daquelas crianças que não introduziram (233 dias). Ainda que os resultados mostrem uma possível associação entre o uso de chupeta e o desmame precoce ainda são necessários estudos para corroborar esta possível associação.